

## **FICHE TECHNIQUE NYNA D+ CEREALES**

**CEREALES A 0,005 % DE DIFENACOUM ET 0,001 % DE DENATONIUM BENZOATE**

### **COMPOSITION**

Rodenticide anticoagulant  
Matière active : Difénacoum  
Taux de matière active : 0.005 %  
Support : céréales

### **AUTORISATION DE VENTE**

**Renseignement concernant le fournisseur de la fiche technique :**

FRANCE FLUIDES  
ZONE INDUSTRIELLE DES TOURONDES  
BP 100  
82302 CAUSSADE CEDEX  
Tél. : 05 63 27 16 57  
Port. : 06 72 81 47 11  
FAX : 05 63 03 75 31  
e-mail: [contact@france-fluides.com](mailto:contact@france-fluides.com)  
[www.france-fluides.com](http://www.france-fluides.com)

► Professionnels de la lutte contre les rongeurs : FR-2013-0020

Présentation en vrac ou en sachets, conditionnement supérieur à 5kg.

► Grand public et professionnels non spécialistes de la lutte contre les rongeurs: FR-2013-1013

Présentation en sachet, conditionnement inférieur ou égale à 1,5kg.

### **MODE D'ACTION**

Par ingestion répétée  
Anticoagulant

### **METHODE D'APPLICATION**

Porter des gants. Déposer dans des postes d'appâtage :

-Sachets : 2 sachets pour des souris, 8 pour des rats (ne pas ouvrir les sachets).

-Vrac : 40g pour des souris, 200 pour des rats.

Espacer les postes de 1 à 2 mètres pour des souris, de 5 à 10 mètres pour des rats. Les postes doivent être placés le long des chemins empruntés par les rongeurs et dans les endroits les plus fréquentés. Inspecter et réapprovisionner les postes quelques jours après la première application puis une fois par semaine. Tant que l'appât est consommé, ne pas nettoyer les postes entre deux applications. Ramasser les sachets ou produits restants, les détruire conformément à la réglementation en vigueur. Ramasser les cadavres, les enterrer ou les envoyer à l'équarrissage (à partir de 40kg). Les symptômes apparaissent 36 h après l'ingestion et les rongeurs meurent en 4 à 10 jours. Retirer tous les postes après la fin du traitement.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Le produit ne peut être utilisé que dans des postes d'appâtage sécurisés. Les postes doivent être placés de manière sûre pour minimiser les risques d'accès au produit et d'ingestion par des enfants ou des animaux non cibles. S'assurer que les boîtes sont correctement fermées pour éviter que les appâts ne soient sortis des postes par les rongeurs. Ne pas traiter les surfaces et les ustensiles qui pourraient être en contact avec des aliments afin d'éviter toute contamination des aliments destinés à la consommation humaine et animale.

Ne pas rejeter le produit dans l'environnement ou les canalisations. Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement. Déposer les postes usagés et les appâts non consommés ou non utilisés dans une déchetterie ou dans tout autre centre de collecte approprié. L'emballage ne doit pas être réutilisé ni recyclé. Les boîtes à appât ne doivent pas être utilisées pour contenir d'autres produits que les rodenticides. Retirer toutes les boîtes à appât après la fin du traitement.

Lire attentivement la fiche de sécurité.

S1/2 : Conserver sous clé et hors de portée des enfants.

S13 : Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux des animaux.

S20/21 : Ne pas manger, boire et fumer pendant l'utilisation.

S35 : Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toute précaution d'usage.

S49 : Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage et l'étiquette. En cas d'ingestion, se rincer la bouche, ne pas faire vomir. Quelle que soit la quantité de produit ingéré, ne pas manger et ne pas boire. En cas de détresse aiguë, contacter le 15 (ou 112).

En cas de malaise, consulter un médecin et lui montrer l'étiquette du produit

\*En cas d'exposition contacter sans délai et dans tous les cas un centre antipoison, un SAMU ou un médecin, décrire la situation (fournir les indications de l'étiquette, évaluer la dose d'exposition). Parallèlement et en attendant de réponse : En cas d'inhalation, respirer de l'air frais et se reposer, En cas de contact avec la peau enlever les vêtements contaminés et laver la peau au savon, puis rincer abondamment à l'eau. Ne pas utiliser de solvant ou diluant. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment sous un mince filet d'eau (tiède si possible) durant plusieurs minutes en maintenant les paupières ouvertes sous le filet d'eau.

\*Empêcher l'accès aux enfants, aux animaux de compagnie et aux animaux non cibles. Stocker à l'abri de la lumière.

## ANTIDOTE

NYNA D+ CEREALES contient un rodenticide anticoagulant, un traitement à la vitamine K1 pourrait être nécessaire pendant une longue période.

Centres antipoisons : INRS 01 45 42 59 59

## CONDITIONNEMENT

Seaux

Sacs

Caisses